

GRYPA

a ciąża

W czasie ciąży spada odporność w kontakcie z wirusami i pasożytami

Wszystkie infekcje cechują się cięższym przebiegiem i dużo trudniej je wyleczyć



Kobiety w ciąży narażone są na zwiększone ryzyko powikłań grypy takich jak:



zapalenie mięśnia serca, oskrzeli lub płuc



poronienie we wczesnej ciąży


przedwczesna czynność skurczowa w ciąży zaawansowanej



niekorzystne zakończenie ciąży



U **jednej na pięć** kobiet spodziewających się dziecka grypa może przejść w **zapalenie płuc**. Bywa, że wymaga ono nawet pobytu na oddziale intensywnej terapii.¹



Zakażenie grypą w ciąży jest najbardziej niebezpieczne w pierwszym trymestrze ciąży, gdyż może powodować **wady wrodzone dziecka**.¹

32% ciężarnych chorujących na grypę **wymaga hospitalizacji**¹



9% hospitalizowanych z powodu grypy kobiet w ciąży **wymagało leczenia** w oddziałach intensywnej opieki medycznej (**OIOM**)²



Szczepienie przeciw GRYPPIE

a ciąża



Szczepienie przeciw grypie
chroni przyszłą mamę i jej dziecko
przed i po porodzie



Przeciw grypie można się zaszczepić
w dowolnym momencie ciąży

Nie ma żadnych ograniczeń co do odstępu
pomiędzy szczepieniem a ciążą



Szczepienie przeciw grypie kobiet w ciąży **skutecznie
chroni niemowlęta**, gdyż matczyne przeciwciała
są aktywnie transportowane przez łożysko do dziecka^{3,4}

↑ 70%



skuteczność szczepienia kobiet
w drugim i trzecim trymestrze ciąży⁵

↓ 63%



w pierwszych sześciu miesiącach życia
**niemowlęta zaszczepionych matek
chorują na grypę rzadziej o 63%**
niż dzieci matek niezaszczepionych

Szczepienia
są bezpieczne^{6,7}:



- Nie stwierdzono częstszego występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych
- Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka poronienia, porodu przedwczesnego oraz konieczności rozwiązania ciąży cięciem cesarskim
- Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka występowania wad rozwojowych u płodu oraz niekorzystnego wpływu na rozwój psychomotoryczny dzieci

Szczepienia
dla kobiet w ciąży
są refundowane
(z 50% odpłatnością)

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży
są rekomendowane m.in. przez:



Ministra Zdrowia RP, Światową Organizację Zdrowia (WHO), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (CDC – ACIP), Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG), Krajową Służbę Zdrowia Wielkiej Brytanii (NHS).

1. B. Jamieson D.J., Honein M.A., Rasmussen S.A. i wsp. Novel Influenza A (H1N1) Pregnancy Working Group. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. *Lancet* 2009; 374 (9688): 451–458. 2. Zaman K, Roy E, Arifeen S et al., *N Engl J Med* 2008, 359, 1555–1564. 3. Ortiz JR, et al. *Vaccine* 2011 (29):4439–52. 4. Eick AA, et al. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2010(165)NO.2. 5. Tapia M, et al. *Lancet Infect Dis* 2016;16:1026–35. 6. Pool V, Iskander J, *Am J Obstet Gynecol* 2006,194,1200. 7. Munoz F, Gresinger A, Wehmahen et al., *Am J Obstet Gynecol* 2005, 192, 1098–1106.

www.opzg.pl